

2024.11

		種 類 (予防する病気)	ワクチンの 種類	接種開始年齢	当院のお勧めする接種時期・接種間隔	※定期接種は予診票の使用期限をご確認ください
1才までの予防接種	定期	種混合(DPT-IPV-Hib) (ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、細菌性髄膜炎など)	不活化	2ヶ月から	2ヶ月～ 4～8週の間隔で3回接種 追加は1才以降で1回(最後の接種から6～18ヶ月の間に)	
	定期	肺炎球菌(PCV) (細菌性髄膜炎など)	不活化	2ヶ月から	2ヶ月～ 4週間以上の間隔で3回接種 追加は1才～1才3ヶ月で1回(最後の接種から60日以上あける)	
	定期	B型肝炎(HB)	不活化	2ヶ月から	2ヶ月～3回接種 1回目から4週以上あけて2回目、1回目から20週以上あけて3回目 ※母子感染予防の場合は任意接種となり、スケジュールが異なります。	
	定期	ロ タ(Rotavirus) (ロタウイルス胃腸炎)	生 (経口)	6週間から	2ヶ月～生後14週6日までに1回目、4週間以上あけて生後23週6日までに2回目 (5価のワクチンは31週6日までに3回目) ※当クリニックでは2回接種の1価ロタウイルスワクチンを基本としています。 異なるロタウイルスワクチンを交互に接種することはできません。	
	定期	B C G (結核)	生 (経皮)	3ヶ月から	5ヶ月～8ヶ月の間に1回(1才前日までに)	
1才以降の予防接種	定期	麻疹風疹混合(MR)	生	1才から	第1期:1才～2才未満に1回 第2期:就学前の1年間に1回	
	定期	水 痘	生	1才から	1才～1回目 1回目から6～12ヶ月あけて2回目(3才前日までに)	
	任意	おたふくかぜ	生	1才から	1才～1回目 5～7才で2回目	
	定期	日 本 脳 炎	不活化	3才から	第1期:初回は1～4週あけて2回 初回終了から6ヶ月～1年あけて追加1回 第2期:9～12才で1回 ※罹患リスクが高い場合、希望により 6ヶ月から定期接種が可能	
	任意	3種混合(DPT) (学童期以降の百日咳予防目的)	不活化	5才から	5～6才 1回 11～12才 DTの代わりにDPT接種也可	
	定期	2種混合(DT) (ジフテリア、破傷風)	不活化	11才から	11才～12才で1回	
	定期	ヒトパピローマウイルス (HPV) (子宮頸がんなど)	不活化	小学6年生 から	中学1年生～1回目 6～12か月後に2回目 15才以上で開始の場合 1回目から2ヶ月後に2回目 1回目から6ヶ月後に3回目	
	任意	インフルエンザ	不活化 生(経鼻)	6ヶ月から 2才から	2～4週間おきに2回(毎年10～12月)・13才以上は1回 2才～18才 1回(毎年10～12月)	